

## ตารางสรุปการรับวัคซีนในผู้ใหญ่

	14-26 ปี	27-45 ปี	46-60 ปี	> 60 ปี
บาดทะยักและคอตีบ (Td or Tdap) (กระตุ้นทุก 10 ปี)	วันที่ _____ วันที่ _____	วันที่ _____ วันที่ _____	วันที่ _____ วันที่ _____	วันที่ _____ วันที่ _____
ไข้หวัดใหญ่ (กระตุ้นทุกปี)	วันที่ _____ วันที่ _____ วันที่ _____	วันที่ _____ วันที่ _____ วันที่ _____	วันที่ _____ วันที่ _____ วันที่ _____	วันที่ _____ วันที่ _____ วันที่ _____
เอชพีวี (HPV) ฉีดได้ทั้งชายและหญิง	3 เข็ม ที่ 0, 2, 6 เดือน วันที่ _____ วันที่ _____ วันที่ _____			
หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) ทุกคนที่ไม่เคยฉีด หรือเคยแต่เป็นกลุ่มเสี่ยง	2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน วันที่ _____ วันที่ _____			
ไข้เลือดออก (DEN)	3 เข็ม ที่ 0, 6, 12 เดือน วันที่ _____ วันที่ _____ วันที่ _____			
ตับอักเสบบี (HAV)	ถ้าไม่เคยฉีดเลย 2 เข็ม ที่ 0, 6 เดือน วันที่ _____ วันที่ _____	ถ้า anti-HAV IgG = negative 2 เข็ม ที่ 0, 6 เดือน วันที่ _____ วันที่ _____		
ตับอักเสบบี ตรวจ HBsAg = neg, anti-HBs = neg	3 เข็ม ที่ 0, 1, 6 เดือน วันที่ _____ วันที่ _____ วันที่ _____			
อีสุกอีใส (VZV) ตรวจ anti-VZV IgG = negative	2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน วันที่ _____ วันที่ _____			
งูสวัด (Zoster)				วันที่ _____
นิวโมคอคคัส (PCV)				วันที่ _____
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningococcal) เฉพาะผู้ที่เดินทางไปยังบางประเทศ	ฉีดก่อนเข้าประเทศ 10 วัน Booster ทุก 3-5 ปี วันที่ _____ วันที่ _____ วันที่ _____ วันที่ _____			
ไข้สมองอักเสบ (JE) เฉพาะผู้ที่เดินทางไปยังบางประเทศ	3 เข็ม วันที่ 0, 7, 30 วันที่ _____ วันที่ _____ วันที่ _____			
พิษสุนัขบ้า pre-exposure ในกลุ่มเสี่ยง	3 เข็ม วันที่ 0, 7, 21 วันที่ _____ วันที่ _____ วันที่ _____			
พิษสุนัขบ้า post-exposure	5 เข็ม วันที่ 0, 3, 7, 14, 28 วันที่ _____ วันที่ _____ วันที่ _____ วันที่ _____ วันที่ _____ กระตุ้น 1 เข็ม หากฉีดครบภายใน 6 เดือน กระตุ้น 2 เข็ม วันที่ 0, 3 หากฉีดมาเกิน 6 เดือน			

วัคซีนในคนท้อง

1. Td 2 เข็ม หรือ Tdap 1 เข็ม at 3<sup>rd</sup> trimester

2. Influenza 1 เข็ม at 2<sup>nd</sup> or 3<sup>rd</sup> trimester

วัคซีนที่ห้ามให้ในคนท้อง, คนที่ภูมิต้านทานบกพร่อง, คนที่กินยากดภูมิต้านทาน

VZV, MMR, HPV, Dengue, Zoster

บาดทะยัก มีผลภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีหลังฉีดเข็มสุดท้าย ไม่จำเป็นต้องฉีดซ้ำอีก

หากเกิน 5 ปีให้ฉีดกระตุ้น 0.5 มล. เข้ากล้ามเนื้อเพียงครั้งเดียว

ไม่เคยฉีดหรือไม่ทราบที่เคยฉีดมาก่อนหรือไม่ ให้ฉีด 3 เข็ม ที่ 0, 1, 6 เดือน