

ตารางสรุปการรับวัคซีนในเด็ก ปี 2566

แรกเกิด – 6 เดือน

	แรกเกิด	1 เดือน	2 เดือน	4 เดือน	6 เดือน
วัณโรค (BCG)	วันที่ _____				
ตับอักเสบบี	วันที่ _____	วันที่ _____	วันที่ _____ (วัคซีนผสม)	วันที่ _____ (วัคซีนผสม)	วันที่ _____ (วัคซีนผสม)
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน					
ฮิบ (Hib)					
โปลิโอ			วันที่ _____	วันที่ _____	วันที่ _____
โรต้า (Rota)			วันที่ _____	วันที่ _____	วันที่ _____
นิวโมคอคคัส (PCV)			วันที่ _____	วันที่ _____	วันที่ _____

9 เดือน – 2 ปี

	9-12 เดือน	12-15 เดือน	18 เดือน	2 ปี
หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR)	วันที่ _____		วันที่ _____	
อีสุกอีใส (VZV)	วันที่ _____		วันที่ _____	
ไข้มองอักเสบ (JE)	วันที่ _____			วันที่ _____
ไขหวัดใหญ่ (2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน)	วันที่ _____	วันที่ _____		
มือเท้าปาก (EV 71) ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน ตั้งแต่อายุ 6 เดือน-6 ปี	วันที่ _____ วันที่ _____			
นิวโมคอคคัส (PCV) (กระตุ้น)		วันที่ _____		
ตับอักเสบบี (HAV)		วันที่ _____		วันที่ _____
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (กระตุ้น)			วันที่ _____	
โปลิโอ (กระตุ้น)			วันที่ _____	

4 – 13 ปี

	4-6 ปี	9 ปี	10-11 ปี	12-13 ปี
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (กระตุ้น)	วันที่ _____			
โปลิโอ (กระตุ้น)	วันที่ _____			
บาดทะยัก (Td, Tdap, DT)			วันที่ _____	
เอชพีวี (HPV) บังคับเฉพาะ ดญ. ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน			วันที่ _____	วันที่ _____
ไข้เลือดออก (DEN) (2-3 เข็ม แล้วแต่นิ่วัดขึ้น)		วันที่ _____	วันที่ _____	วันที่ _____
นิวโมคอคคัส (PCV) (กระตุ้น)			วันที่ _____	

จากนั้น บาดทะยักควรกระตุ้นทุก 10 ปี, ไขหวัดใหญ่ควรกระตุ้นทุก 1 ปี

ช่องที่ระบายสีคือวัคซีนที่จำเป็น